

Uji Toleransi Beberapa Varieties Padi (Oryza sativa L.) Terhadap Naungan

by Alridiwirsah Alridiwirsah

Submission date: 11-Oct-2023 03:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2192306194

File name: nsi_Beberapa_Varieties_Padi_Oryza_sativa_L._Terhadap_Naungan.pdf (159.48K)

Word count: 4317

Character count: 24663

3 UJI TOLERANSI BEBERAPA VARIETAS PADI (*Oryza sativa* L.) TERHADAP NAUNGAN

Alridiwersah^{1*}, Hamidah H², Erwin M.H², Muchtar Y²

¹Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan- 20238

²Program Studi Pasca Sarjana Pertanian³¹ Universitas Sumatera Utara Medan- 20155

*Corresponding author: alridiwersah@gmail.com

ABSTRAK

3
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji toleransi beberapa varietas padi (*Oryza sativa* L.) terhadap variasi intensitas penyinaran. Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2015. di Kebun Percobaan Pasar Miring, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara. Jl. Raya⁷ alang Km 8,2 Lubuk Pakam, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan 2 faktor, yaitu: yang pertama faktor Naungan (N) sebagai petak utama dengan 3 taraf yaitu: N₀ = tanpa naungan (100% intensitas penyinaran), N₁ = dinaungi 25% (75% intensitas penyinaran), N₂ = dinaungi 50% (50% intensitas penyinaran). Yang kedua faktor varietas padi (V) sebagai anak petak dengan 5 taraf yaitu : V₁= varietas Sidenuk, V₂= varietas Ciherang, V₃= varietas Inpari 10, V₄= varietas Inpari 30 dan V₅= varietas Mugibat. Jumlah kombinasi perlakuan 15 kombinasi yang diulang sebanyak 3 kali menghasilkan 45 satuan percobaan, jumlah tanaman per plot 40 tanaman dengan 10 tanaman sampel, jumlah¹⁸ tanaman keseluruhan adalah 1800 tanaman dengan jumlah sampel seluruhnya 450 tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan intensitas²² penyinaran (naungan) berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman 14 MST, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, jumlah gabah berisi per malai, berat gabah kering per p²⁰ dan berat gabah kering per Ha. Sedangkan parameter tinggi tanaman 2, 4 dan 6 MST, panjang malai, jumlah³⁵ gabah per malai, jumlah gabah hampa per malai, berat gabah 1000 biji, kandungan klorofil A, kandungan klorofil B, kandungan klorofil Total tidak berpengaruh ya²² nyata. Pada perlakuan varietas berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, jumlah gabah per malai, jumlah gabah berisi per malai, sedangkan terhadap panjang malai, jumlah gabah hampa per malai, berat gabah 1000 biji, kandungan klorofil A, kandungan klorofil B, kandungan klorofil Total, berat gabah kering per plot, berat gabah kering per Ha, penggunaan varietas tidak memberikan perbedaan yang nyata. Interaksi varietas dan intensitas penyinaran memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah anakan dan jumlah anakan produktif. Seda³⁹ kan parameter tinggi tanaman, jumlah gabah per malai, jumlah gabah berisi per malai, panjang malai, jumlah gabah hampa per malai, kandungan klorofil A, kandungan klorofil B, kandungan klorofil Total, berat gabah 1000 butir, berat gabah kering per plot dan berat gabah kering per Ha tidak memberikan perbedaan yang nyata.

29
Kata kunci : Intensitas naungan, Toleransi dan Varietas padi sawah

PENDAHULUAN

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman¹⁴ pangan dari golongan gramineae yang berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Padi

(*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan paling penting di negara-negara berkembang dan merupakan makanan pokok di Indonesia sehingga merupakan komoditas strategis. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan

tersebar di banyak pulau akan dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pangan impor dan dapat menyebabkan rentannya ketahanan pangan, yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan politik (Perdana, 2007 ; Ramli, 2012).

Dewasa ini alih fungsi lahan sawah irigasi semakin meningkat dari tahun ke tahun yang dipicu oleh adanya kebutuhan untuk berbagai peruntukan yang lebih ekonomis. Berdasarkan data secara nasional, laju konversi lahan sawah irigasi itu telah mencapai 40.000 ha per tahun. Konversi ini sebagian besar terjadi di Jawa dan Sumatera. Bila produksi gabah kering giling (GKG) rata-rata 6 ton/ha/panen dan dalam satu tahun tanam padi dua kali musim tanam, maka produksi GKG nasional menyusut 4.840.000 ton per tahun (Susanto, 2008).

Lebih lanjut Badan Ketahanan Pangan Nasional menyatakan konversi lahan pertanian di Indonesia pada 2009 luasnya mencapai 110 ribu hektar per tahun yang digunakan untuk kegiatan lain seperti pembangunan perumahan dan alih fungsi sebagai lahan perkebunan (Sutjahjo, 2011).

Tingginya alih fungsi lahan pertanian padi beririgasi, diperlukan suatu kajian alternatif tentang sistem pertanian tumpang sari padi dengan tanaman tahunan. Sehingga produksi padi tetap tersedia dan ketahanan pangan dapat dipert¹⁹ankan.

Cahaya matahari merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Serapan cahaya matahari oleh tajuk tanaman merupakan faktor penting yang menentukan fotosintesis untuk menghasilkan asimilat bagi pembentukan bunga, buah dan biji. Cahaya matahari diserap tajuk tanaman secara proporsional dengan total lu⁹ lahan yang dinaungi oleh tajuk tanaman. Jumlah, sebaran, dan sudut daun pada suatu tajuk tanaman menentukan serapan dan sebaran cahaya matahari sehingga mempengaruhi

fotosintesis dan hasil tanaman (Harsanti, 2011).

K²⁷urangan cahaya matahari dan air sangat mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung tergantung pada jenis tumbuhan. K⁴profil dibuat dari hasil-hasil fotosintesis. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil sehingga daun menjadi pucat. Akan tetapi, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak (Lukitasari, 2011).

Padi termasuk tanaman C3 yang dapat memfiksasi karbon atmosferi (CO₂) menjadi intermediet berkarbon rangkap tiga pada proses fotosintesis. Tanaman C3 dapat mengalami kehilangan air lebih banyak dibandingkan tanaman C4 seperti jagung dan sorgum. Tanaman C3 memiliki rasio transpirasi yang lebih tinggi dan keadaan stomata selalu terbuka. Tanaman C3 mengalami fotorespirasi yang berdampak pada hasil bersih fotosintesisnya lebih rendah dari tanaman C4. Untuk mengatasi intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Pemberian naungan dilakukan pada budidaya tanaman yang umumnya termasuk kelompok C3 maupun dalam fase pembibitan. Pada tanaman kelompok C3, naungan tidak hanya diperlukan pada fase bibit saja, tetapi sepanjang siklus hidup tanaman. Semakin dewasa umur tanaman, intensitas naungan semakin dikurangi. Naungan selain diperlukan untuk mengurangi intensitas cahaya yang sampai ke tanaman pokok, juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode pengendalian gulma (Priyatno, 2012).

Intensitas cahaya dan lama penyinaran dalam fotosintesis berpengaruh pada pertumbuhan (vegetatif) dan kegiatan reproduksi (generatif) tumbuhan di daerah tropis, lamanya siang dan malam relatif sama, yaitu 12 jam sedangkan daerah yang memiliki empat musim, lamanya siang hari dapat mencapai 16 – 20 jam. Respon tumbuhan terhadap fotoperiodik dapat berupa pembungaan, perkecambahan, dan perkembangan (Pertamawati, 2010).

Upaya peningkatan produksi padi salah satunya adalah melalui inovasi teknologi varietas unggul baru. Varietas unggul baru selain untuk meningkatkan potensi hasil tinggi juga perlu memperhatikan mutu produk yang dihasilkan mauoun terhadap faktor-faktor pengganggu yang lain. Pen²⁸katan produktifitas usaha tani komoditi tanaman

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Pasar Miring, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara, Jl. Raya-Galang Km 8,2 Lubuk Pakam, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2015. Penelitian yang digunakan adalah 5 varietas padi yaitu Inpari 10, Inpari 30, Sidenuk, Ciherang, Mugibat, paranet 25% dan 50%, ban¹¹u, pupuk Urea, TSP, KCL, insektisida kenfas ¹00 EC (Alfa sipermethria 100 g/l), baycarb (BPMC (2-Ci-methyl propy) Phenyl Methyl carbamate), herbisida empat enam, Ally-Plus (Methyl metsulfuron), moluskisida debestan (besnoid 400 gr), fungisida explore (Difenokonazol 250 g/l). Alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

60%-65% ditentukan oleh penggunaan/bibit unggul. Untuk memperkenalkan dan mengembangkan varietas unggul baru maka cara yang paling efektif adalah menguji varietas-varietas unggul baru dan ditanam dilahan petani (Anonim, 2000)

cangkul, garu, timbangan analitik, spektrofotometer Uv-Vis, Light intensiome¹⁸, gergaji, parang, meteran, alat tulis dan alat lain yang mendukung dalam⁷enelitian ini .

Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) tiga ulangan, dengan 2 faktor yang teliti, yaitu, faktor pertama, naungan (N) sebagai petak utama dengan 3 taraf yaitu; N_0 = tanpa naungan (100% intensitas penyinaran), N_1 = dinaungi 25% (75% intensitas penyinaran), N_2 = dinaungi 50% (50% intensitas penyinaran), Varietas padi (V) sebagai anak petak dengan 5 varietas, V_1 = varietas Sidenuk, V_2 = varietas Ciherang, V_3 = varietas Inpari 10, V_4 = varietas Inpari 30, V_5 = varietas Megi³⁶. Luas Plot percobaan 200 cm x 100, dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, jumlah tanaman perplot 40 tanaman,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat optimasi intensitas penyinaran terhadap pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi

Berdasarkan hasil sidik ragam ³²at diketahui bahwa perlakuan naungan berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman 14 MST, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, berat gabah per plot dan berat gabah per Ha. Sedangkan parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, jumlah gabah

permalai dan jumlah gabah berisi tidak berpengaruh yang nyata.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada pengamatan paratameter tinggi tanaman 14 MST menunjukkan hasil yang nyata tinggi tanaman tertinggi terdapat pada N_2 pada perlakuan 50% intensitas penyinaran dengan tinggi tanaman 118,03 cm, dan terendah terdapat pada N_0 pada perlakuan 100% intensitas penyinaran dengan tinggi tanaman 109,39 cm. Pengaruh penaungan menunjukkan pengaruh yang nyata

terhadap intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman padi. Hal ini disebabkan karena tanaman kekurangan cahaya sehingga mengalami etiolasi. Akibatnya tinggi tanaman yang mendapat pencahayaan lebih tinggi dari tanaman kontrol atau yang tidak mendapat pencahayaan. Menurut (Gatut, 2011) tanaman yang mendapat cekaman naungan cenderung mempunyai jumlah cabang sedikit dan batang yang lebih tinggi dibanding tanaman yang ditanam dalam kondisi tanpa naungan. Perubahan tinggi batang tanaman pada beberapa tanaman akibat naungan sudah tampak mengalami etiolasi pada naungan lebih dari 25%. Etiolasi yang terjadi pada sebagian besar tanaman akibat naungan disebabkan karena adanya produksi dan distribusi auksin yang tinggi, sehingga merangsang pemanjangan sel yang mendorong meningkatnya tinggi tanaman.

Parameter jumlah anakan menunjukkan hasil yang nyata, jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan N₀ 100% intensitas penyinaran dengan jumlah anakan 21,34 dan jumlah anakan terendah terdapat pada perlakuan N₂ pada perlakuan 50% intensitas penyinaran dengan jumlah anakan 12,73. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada parameter jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan N₀. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemberian tingkat pencahayaan yang semakin tinggi dapat menurunkan jumlah anakan tanaman padi. Hal ini dikarenakan hasil fotosintat yang dihasilkan digunakan untuk meningkatkan tinggi tanaman pada tanaman yang mengalami perlakuan pencahayaan, Sedangkan pada tanaman yang tidak mendapat perlakuan pencahayaan (N₀), fotosintat digunakan untuk membentuk anakan. Alnopri (2004) menyatakan pembentukan anakan, pertumbuhan dan produksi tergantung dari dua faktor yaitu faktor keturunan (faktor dalam) diantaranya faktor genetis, lamanya pertumbuhan tanaman, kultivar dan faktor luar meliputi cahaya, suhu, kelembaban, kesuburan tanah, serta pertumbuhan tunas.

Parameter jumlah anakan produktif menunjukkan hasil yang nyata, jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan N₀ 100% intensitas penyinaran dengan jumlah anakan 18,38 dan jumlah anakan terendah terdapat pada perlakuan N₂ pada perlakuan 50% intensitas penyinaran dengan jumlah anakan 9,47. Menurut (Anonim 1983) menyebutkan anakan produktif erat kaitannya dengan jumlah anakan maksimum dimana makin banyak jumlah anakan maksimum maka jumlah anakan produktif nyata lebih banyak.

Parameter berat gabah per plot menunjukkan hasil yang nyata, jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan N₀ 100% intensitas penyinaran dengan berat gabah 1,52 dan berat gabah terendah terdapat pada perlakuan N₂ pada perlakuan 50% intensitas penyinaran dengan jumlah anakan 0,58. Dan parameter berat gabah per Ha yang nyata, berat gabah tertinggi terdapat pada perlakuan N₀ 100% intensitas penyinaran dengan berat gabah 7,6 dan berat gabah terendah terdapat pada perlakuan N₂ pada perlakuan 50% intensitas penyinaran dengan jumlah anakan 2,94. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada parameter berat gabah per plot dan berat gabah per Ha tertinggi terdapat pada perlakuan N₀. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemberian tingkat pencahayaan yang semakin tinggi dapat meningkatkan jumlah kehampaan pada tanaman padi. Jumlah intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman padi semakin rendah diakibatkan oleh adanya pencahayaan. Intensitas cahaya yang rendah pada saat pembungaan padi dapat menurunkan karbohidrat yang terbentuk, sehingga menyebabkan meningkatnya gabah hampa. Menurut Abdullah (2004) bahwa agar diperoleh hasil panen yang tinggi harus mempunyai luas daun bendera yang lebar yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari yang masuk ke tanaman dan digunakan untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan cadangan yang berupa beras. Pada perlakuan N₂ pada perlakuan 50% intensitas penyinaran

banyak gabah yang hampa, hal ini di karenakan suhu di dalam naungan sangat rendah sehingga mempengaruhi proses pembuahan. Menurut Perdana (2007) temperatur sangat mempengaruhi pengisian biji padi. Temperatur yang rendah dan kelembaban yang tinggi pada waktu pembungaan akan mengganggu proses pembuahan yang mengakibatkan gabah menjadi hampa. Hal ini terjadi akibat tidak membukanya bakal biji. Temperatur yang juga rendah pada waktu bunting dapat menyebabkan rusaknya pollen dan menunda pembukaan tepung sari.

Respon pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi pada kondisi naungan berbeda

Berdasarkan hasil sidik ragam dapat diketahui bahwa perlakuan varietas berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, jumlah gabah permalai, jumlah gabah berisi, sedangkan terhadap panjang malai, jumlah gabah hampa, jumlah klorofil total, berat gabah 1000 butir, berat gabah per plot, berat gabah per Ha, penggunaan varietas tidak memberikan perbedaan yang nyata.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada pengamatan paratameter tinggi tanaman 14 MST menunjukkan hasil yang nyata. Tinggi tanaman tertinggi pada tanaman padi terdapat pada perlakuan V_1 pada varietas sidenuk dengan tinggi tanaman 118,87 cm dan terendah terdapat pada perlakuan V_5 pada varietas mugibat dengan tinggi tanaman 111,26 cm. Hal ini di sebabkan karena pertumbuhan antara varietas yang satu dengan varietas yang lain tidak seragam. Perbedaan tinggi tanaman dari masing-masing varietas di sebabkan karena adanya perbedaan genetik. Perbedaan genetik ini mengakibatkan setiap varietas memiliki ciri khusus yang berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai literatur Sitompul dan

Guritno (1995) yang menyatakan bahwa perbedaan susunan genetik merupakan salah satu faktor penyebab keragaman penampilan tanaman. Program genetik yang akan di ekspresikan pada berbagai sifat tanaman yang mencakup bentuk dan fungsi tanaman yang menghasilkan keragaman pertumbuhan tanaman meskipun bahan tanaman yang digunakan berasal dari tanaman yang sama.

Pada pengamatan paratameter jumlah anakan 6 MST menunjukkan hasil yang nyata. Jumlah anakan tertinggi pada tanaman padi terdapat pada perlakuan V_2 pada varietas ciherang dengan jumlah anakan 17,75 dan jumlah terendah terdapat pada perlakuan V_4 pada varietas inpari 30 dengan jumlah anakan 14. Dan pada pengamatan paratameter jumlah anakan produktif menunjukkan hasil yang nyata. Jumlah anakan tertinggi pada tanaman padi terdapat pada perlakuan V_3 pada varietas inpari 10 dengan jumlah anakan 13,33 dan jumlah terendah terdapat pada perlakuan V_4 pada varietas inpari 30 dengan jumlah anakan 11,4. Hal ini diakibatkan jumlah anakan dan jumlah anakan produktif pada beberapa varietas berbeda, seperti terdapat pada deskripsi tanaman untuk V_3 varietas inpari 10 jumlah anakan yang di hasilkannya lebih banyak di bandingkan pada V_4 varietas inpari 30 yang jumlah anakannya sedikit. Hal ini sesuai literatur Kanisius (1990) yang menyatakan jumlah anakan maksimum, dicapai pada umur 50-60 hari setelah tanam. Kemudian anakan yang terbentuk setelah mencapai batas maksimum akan berkurang karena pertumbuhannya yang lemah, bahkan mati, sedangkan anakan yang terbentuk dari masing-masing varietas mempunyai jumlah yang berbeda-beda yaitu antara 19 sampai dengan 54 anakan. Jumlah anakan juga di pengaruhi oleh tingginya temperatur, pada temperatur tinggi, jumlah anakan yang terbentuk lebih banyak.

Pada parameter jumlah gabah permalai tertinggi pada tanaman padi

terdapat pada perlakuan V_1 pada varietas sidenuk dengan jumlah gabah 190,42 dan jumlah gabah terendah terdapat pada perlakuan V_5 varietas mugibat dengan jumlah gabah 137,14. Hal ini kemungkinan varietas sidenuk memiliki daya adaptasi kondisi lingkungan yang tinggi dibandingkan dengan varietas-varietas yang lainnya sehingga memiliki jumlah gabah per malai yang banyak. Menurut Qamara (1995) menyatakan bahwa kultivar padi dapat dikelompokkan atas dasar (1) kepekaan terhadap fotoperiodik, (2) jenis pengelolaan airnya, (3) tipe tanaman dan (4) kandungan pati endospermnya, dimana perbedaan variasi sifat akan menyebabkan perbedaan tingkat adaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Adapun perbedaan sifat-sifat kultivar yang utama antara lain waktu mencapai 50 % muncul malai (cepat atau lambat), jumlah gabah per malai dan panjang batang sampai malai (pendek atau panjang). Selain itu, adanya perbedaan karakter fenotipe yang tampak dari masing-masing varietas disebabkan oleh adanya perbedaan gen yang mengatur karakter tersebut.

Pada parameter jumlah gabah berisi per malai tertinggi pada tanaman padi terdapat pada perlakuan V_1 pada varietas sidenuk dengan jumlah gabah berisi 131,16 dan jumlah gabah berisi terendah terdapat pada perlakuan V_5 pada varietas mugibat dengan jumlah gabah berisi 100,44. Hal ini kemungkinan di pengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik.

Hubungan variasi intensitas penyinaran terhadap pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi

Interaksi varietas dengan intensitas penyinaran memberikan pengaruh yang nyata terhadap parameter jumlah anakan dan jumlah anakan produktif dan memberikan pengaruh yang nyata pada tinggi tanaman, panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa, jumlah klorofil total,

berat 1000 butir, berat gabah per plot dan berat gabah per Ha.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa respon masing-masing varietas terhadap intensitas penyinaran yang diberikan tanaman memiliki pola yang sama. Artinya adalah tidak memandang dari varietas apa yang digunakan dalam produksi, pemberian naungan akan berdampak pada penghambatan pertumbuhan dan produksi tanaman.

Hal tersebut terbukti dari tidak munculnya pengaruh interaksi varietas dengan pemberian naungan pada pertumbuhan dan produksi secara umum, kecuali pada parameter jumlah anakan dan jumlah anakan produktif. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan ketahanan dari masing-masing varietas terhadap ketahanan perbedaan genetik. Perbedaan genetik ini mengakibatkan setiap varietas memiliki ciri khusus yang berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai literatur Sitompul dan Guritno (1995) yang menyatakan bahwa perbedaan susunan genetik merupakan salah satu faktor penyebab keragaman penampilan tanaman. Program genetik yang akan diekspresikan pada berbagai sifat tanaman yang mencakup bentuk dan fungsi tanaman yang menghasilkan keragaman pertumbuhan tanaman meskipun bahan tanaman yang digunakan berasal dari tanaman yang sama.

SIMPULAN

Penggunaan varietas berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, jumlah gabah per malai dan jumlah gabah berisi. Variasi intensitas penyinaran memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah anakan, jumlah anakan produktif, berat gabah per plot dan berat gabah per Ha.

Interaksi varietas dan intensitas penyinaran memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah anakan pada perlakuan

N₀V₂ (16,33) dan jumlah anakan produktif pada perlakuan N₀V₂ (21,87). Sedangkan terhadap parameter yang lain, interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata. Jumlah gabah produksi tertinggi per plot terdapat pada perlakuan N₀V₃ (1,58) dan terendah terdapat pada perlakuan N₂V₄ (0,45).

SARAN

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan perlakuan naungan, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan varietas yang benar-benar tahan terhadap intensitas penyinaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala dinas pertanian Kabupaten Labura (Kakanda Fakhruddin Nasution, SP) atas perannya memfasilitasi dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2004. Pengaruh perbedaan jumlah dan umur bibit terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah. Dalam Lamid, Z., et al. (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Penerapan Agroinovasi Mendukung Ketahanan Pangan dan Agribisnis. Sukarami
- Alnopri, 2004. Variabilitas genetik dan heritabilitas sifat-sifat pertumbuhan bibit tujuh genotipe kopi robusta-arabika, jurnal-jurnal ilmu pertanian indonesia. Volume. 6, nomor 2, 2004.
- Andoko, A., 2002. Budidaya Padi Secara Organik. Cetakan-I. BALIPANG, 1989. Padi. Edisi ke-2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Badan Litbang Pertanian. 2007. Pedoman Umum Produksi Benih Sumber Padi. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. 37 hal.
- Anonim, 1983. Pedoman Bercocok Tanam Padi Palawija Sayur-sayuran. Departemen Pertanian Satuan Pengendali BIMAS. Jakarta.
- . 2000. TTG-Budidaya Pertanian, Budidaya Padi. Palbapang Bantul
- Atman. 2005. Pengaruh sistem tanam bersahaf dengan P-starter (shafter) pada padi sawah varietas Batang Piaman. Jurnal Stigma Vol. XIII No. 4, Oktober-Desember 2005. Faperta Universitas Andalas Padang.
- Darliah, I. Suprihatin, D. P. Devries, W. Handayati, T. Hermawati dan later., 2001. Variabilitas Genetik, Heritabilitas, dan Penampilan Fenotipik 18. Klon Mawar Cipanas. Zuriat 3 No.11..
- Gatut, W.A.S, T. Sundari, 2011. Perubahan Karakter Agronomi Aksesori Plasma Nutfah Kedelai di Lingkungan Ternaungi. J. Agron. 39:1-6.
- Harsanti, Restiani, 2011. Potensi Hasil Tanaman Padi Gogo yang Berasosiasi dengan Bakteri Fotosintetik *Synechococcus* sp. pada Lingkungan yang Terpapar Berbagai Tingkat Penanangan.
- Hasrizart, I., 2008. Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Varietas Padi Sawah. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/386>. Diakses 15 november 2014.
- Kaderi H. 2004. Pengamatan Percobaan Bahan Organik Terhadap Tanaman Padi Dirumah Kaca. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), Banjar Baru
- Kanisius, 1990. Budidaya Tanaman Padi. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kisman, N. Khumaida, Trikoesoemangtyas, Sobir dan D. Sopandie. 2008. Pola Pewarisan adaptasi Kedelai (*Glycine max* L.Merril) Terhadap Cekaman Naungan Berdasarkan Karakter Morfo-Fisiologi Daun. IPB. Bogor.

- Lakitan, 1993. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Lukitasari, Marheny. 2011. Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine max). http://http://www.academia.edu/6301530/pengaruh_intensitas_cahaya_matahari_terhadap_pertumbuhan_tanaman_kedelai_glycine_max. diakses tanggal 04 november 2014
- Masdar. 2007. Interaksi Jarak Tanam dan Jumlah Bibit per Titik Tanam pada Sistem Intensifikasi Padi terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman. Jurnal Akta Agrosia Edisi Khusus.
- Nurhayati AP, Lontoh, Koswara J. 1999. Pengaruh Intensitas dan Saat Pemberian Naungan terhadap Produksi Ubi Jalar (*Ipomoea batatas* (L.) Lam.). *Bul. Agr* 16:28-38.
- Perdana, A. S. 2007. Budidaya Padi Gogo. Mahasiswa Swadaya Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Pertamawati, 2010. Pengaruh Fotosintesis Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kentang (*Solanum tuberosum* L.) Dalam Lingkungan Fotoautotrof Secara Invitro. Pusat TFM - BPP Teknologi. Jakarta
- Priyatno, T.P., 2012. Pengembangan Padi C4 Strategi Inovasi Adaptif Menghadapi Pemanasan Global. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian.
- Qamara, W, . 1995. Pengantar Produksi Benih. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ramli, 2012. Pengaruh Umur Transplanting Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Berbagai Varietas Padi. Jurnal Agrisistem. Juni 2012, Vol. 8 No. 1 ISSN 1858-4330. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Gowa.
- Siregar H, 1987. Budidaya Tanaman Padi Di Indonesia. PT Sastra Hudaya. Jakarta - pusat.
- Sitompul, B dan B. Guritno. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soeverda, N, 2009. Evaluasi dan Seleksi Varietas Beberapa Tanaman Terhadap Naungan dan Intensitas Cahaya Rendah. Zuriat. Vol.19 No.2.

3

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Beda Rata-Rata Uji Toleransi Beberapa Varietas Padi (*Oryza sativa* L) Terhadap Variasi Intensitas Penyinaran

perlakuan	Tinggi tanaman 14 mst	Jlh anakan	Jumlah anakan produktif	Pjg malai (cm)	Pengamatan						
					Jlh gabah per malai	Jlh gabah berisi per malai	Jlh gabah hampa per malai	Berat gabah 1000 biji	Kadar klorofil total	Berat gabah kering per plot	Berat gabah kering per Ha
Intent penyinaran (N)											
N ₀	109,39 c	21,34a	18,38 a	24,67	161,29	127,19a	35,37	33,22	5,36	1,52 a	7,60 a
N ₁	116,47 b	13,87b	9,79 b	24,04	151,4	108,92b	41,86	34,51	5,74	0,71 b	3,56 b
N ₂	118,03 a	12,73c	9,47 c	24,34	162,27	102,92 c	48,22	32,90	6,47	0,58 c	2,94 c
Varietas (V)											
V ₁	118,87 a	16,04b	12,78 c	24,48	190,42a	131,16a	39,82	39,91	3,34	0,99	4,95
V ₂	116,52 b	17,75a	13,11 a	24,21	160,62b	123,81b	42,34	32,64	3,40	0,96	4,8
V ₃	112,97 c	17,12a	13,33 a	24,57	150,02c	102,65cd	45,1	34,38	3,40	0,99	4,97
V ₄	113,56 c	14 d	11,4 e	24,71	153,4bc	107c	44,34	33,61	3,28	0,92	4,63
V ₅	111,26 d	14,98c	12,1 d	23,81	137,14d	100,4d	37,5	33,18	3,35	0,83	4,16
NxV											
N ₀ V ₁	112,53	20,47	17,67	24,67	182,17	148,23	33,93	33,95	3,15	1,56	7,82
N ₀ V ₂	109,77	21,87	18,57	24,69	155,60	134,77	36,20	32,76	3,45	1,54	7,70
N ₀ V ₃	108,77	21,83	18,93	24,61	157,17	116,50	34,10	34,22	3,49	1,58	7,88
N ₀ V ₄	108,27	20,70	17,83	24,49	156,33	121,57	32,67	33,17	3,16	1,55	7,75
N ₀ V ₅	107,90	21,83	18,90	24,90	155,20	114,90	39,97	32,03	3,26	1,38	6,88
N ₁ V ₁	122,70	13,63	10,43	24,00	153,20	114,20	37,53	33,84	3,43	0,70	3,50
N ₁ V ₂	118,77	16,50	10,70	23,54	161,20	115,57	47,17	33,56	3,31	0,65	3,27
N ₁ V ₃	115,17	15,53	10,73	24,63	156,63	109,07	47,53	35,65	3,46	0,83	4,13
N ₁ V ₄	115,17	11,90	8,67	24,76	155,40	107,53	44,80	34,56	3,25	0,79	3,93
N ₁ V ₅	110,57	11,80	8,40	23,55	130,57	98,27	32,30	34,98	3,45	0,60	3,00
N ₂ V ₁	121,37	14,03	10,27	24,79	235,90	131,07	48,00	33,96	3,46	0,71	3,53
N ₂ V ₂	121,03	14,90	10,07	24,40	165,07	121,10	43,67	31,61	3,45	0,69	3,43
N ₂ V ₃	115,23	14,00	10,33	24,48	136,27	82,40	53,67	33,29	3,25	0,58	2,90
N ₂ V ₄	117,23	9,40	7,70	24,89	148,47	91,90	55,57	33,12	3,45	0,45	2,23
N ₂ V ₅	115,30	11,33	9,00	23,16	125,67	88,17	40,23	32,54	3,36	0,52	2,60
KK (a) %	2,81	5,93	13,89	5,7	15,38	14,66	28,5	5,4	6,49	24,8	24,8
KK (b) %	2,16	7,19	5,50	3,8	18,99	11,85	17,8	4,3	5,12	13,4	13,4

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kolom dan baris yang sama berbeda nyata menurut Uji DMRT 5 %

Uji Toleransi Beberapa Varieties Padi (Oryza sativa L.) Terhadap Naungan

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Alridiwirsah, E M Harahap, E N Akoeb, H Hanum. "Growth and production of new superior rice varieties in the shade intensity", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018

Publication

1 %

2

Tietyk Kartinaty, Rustan Massinai, Deden Fardenan, Riki Warman. "Effect of planting system and seedling number on growth and rice yield rice Inpari-IR-Nutri Zinc", E3S Web of Conferences, 2021

Publication

1 %

3

P A Beding, F Palobo, B M W Tiro, R H S Lestari, M K Rumbarar. "Climate change impact on rice productivity in the rainfed Merauke District, Papua", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

1 %

4

Nani Rohaeni, Farida Farida. "Pengaruh Tingkat Kematangan Buah Terhadap Viabilitas

1 %

Benih Kopi (*Coffea robusta* L.)", Jurnal Pertanian Terpadu, 2019

Publication

5

Rina Dirgahayu Ningsih, Muhammad. Yasin, Aidi Noor. "Rice productivity on tidal swampland in the agricultural assistance area program in Barito Kuala Regency South Kalimantan", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020

Publication

1 %

6

Ridwan Ridwan, Annisa Mar'atus Sholihah, Elhamida Rezkia Amien, Muhammad Amin. "Pengaruh Dosis Pupuk dan Tinggi Permukaan Air pada Budidaya Padi Varietas M70D dengan Media Pasir", Jurnal Agricultural Biosystem Engineering, 2023

Publication

1 %

7

Agustinus Ajak, Roberto I. C. O. Taolin. "Pengaruh Olah Tanah dan Jenis Pupuk Kandang terhadap Pertumbuhan dan Hasil Cabe Rawit Varietas Bara (*Capsicum frutescens* L.)", Savana Cendana, 2016

Publication

<1 %

8

D P Putri, Y Widyastuti, W S Dewi, A Yunus. "The effect of shade and vermicompost application on yield and flavonoid levels of Tempuyung () ", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018

Publication

<1 %

9

Florensia Maria Gradiana Nabuasa.
"Pengaruh Model Ajir dan Pemangkasan
Tunas Lateral terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Tanaman Tomat (*Lycopersicum
esculentum* Mill.) Cv. Lentana", Savana
Cendana, 2016

Publication

<1 %

10

Angga Adriana Imansyah, Ahmad Zidni
Rodhiya. "PENGARUH KEDALAMAN TANAM
TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN PADI
PANDAN PUTRI", Pro-STek, 2020

Publication

<1 %

11

Sri Nurmayanti, M Tahir, Gusti Ayu Putu
Dianti. "Variabilitas, Korelasi, dan Analisis
Kelas Sepuluh Genotipe Nilam (*Pogostemon
cablin* Benth.)", AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu
dan Teknologi Pertanian, 2021

Publication

<1 %

12

D Harjoko, M D Anggraheny, R B Arniputri. "
Study of buffer substrate and Arenga wood
fiber size on hydroponic Kailan () ", IOP
Conference Series: Earth and Environmental
Science, 2018

Publication

<1 %

13

Putriany Simanjuntak, Uswatun Nurjanah,
Edhi Turmudi. "Respon Sawi pada Berbagai
Konsentrasi dan Waktu Pemberian Ekstrak Air
Kulit Buah Jengkol Segar", Akta Agrosia, 2016

<1 %

14

Sela Oktia, Iwan Setiawan, Fournita Agustina. "PATTERN ANALYSIS OF COMMODITY RICE SALES RESULTS IN THE VILLAGE OF THE DISTRICT RIAS TOBOALI SOUTH BANGKA REGENCY", Journal of Integrated Agribusiness, 2020

Publication

15

Siti Aisyah, Chairani Hanum, Revandy Iskandar M Damanik. "Gogo rice agronomic patterns on water supply variables and light intensity", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

16

Agustiansyah Agustiansyah, Ermawati Ermawati, Eko Pramono, A T Wibowo. "PENGARUH PUPUK FOSFAT TERHADAP PERTUMBUHAN, PRODUKSI, DAN MUTU BENIH KEDELAI (GLYCINE MAX L. MERRILL) YANG DITANAM DI LAHAN SAWAH PADA MUSIM KEMARAU", Jurnal Agrotek Tropika, 2020

Publication

17

Wardah Halil, Eka Triana Yuliarsih, Yusmasari Yusmasari, Idaryani Idaryani. "RESPON PETANI PADA PENERAPAN TEKNOLOGI USAHATANI VUB PADI INPARI 24 DI

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

18

Wendelinus Sai Mali, Mairisi Napitupulu,
Zuhdi Yahya. "PENGARUH PEMBERIAN PUPUK
KOMPOS DAN PUPUK NPK PHONSKA
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL
TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L)
VARIETAS HARMONY", AGRIFOR, 2020

Publication

19

Aliyaman, Asriyani. "IDENTIFIKASI SIFAT
KIMIA TANAH, SERAPAN HARA DAN SIFAT
PERTUMBUHAN TANAMAN JAMBU METE
PADA KETINGGIAN TEMPAT BERBEDA DI
KOTA BAUBAU, SULAWESI TENGGARA", Jurnal
Technopreneur (JTech), 2021

Publication

20

Asep Pebriandi, Sulhan Sulhan, Setyawan
Setyawan. "Keragaan Varietas Unggul Baru
Padi Khusus Inpari IR Nutri Zinc di Kutai
Kartanagera Provinsi Kalimantan Timur",
Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan,
2021

Publication

21

Dia Novita Sari, Sumardi Sumardi, Eko
Suprijono. "Pengujian Berbagai Tipe Tanam
Jajar Legowo terhadap Hasil Padi Sawah",
Akta Agrosia, 2014

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

22 Junaidi Junaidi, Djoko Rahardjo. "Upaya Optimalisasi Hasil Panen Padi Menggunakan Berbagai Model Jarak Tanam Dan Dosis Pupuk Kandang", Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis, 2021 $<1\%$

Publication

23 Ade Mukadar, Wardis Girsang, Leunard O Kakisina. "KONTRIBUSI PROGRAM UPSUS PAJALE TERHADAP PENDAPATAN RUMAHTANGGA (STUDI KASUS DI WAIHATU KECAMATAN KAIRATU BARAT)", Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan, 2019 $<1\%$

Publication

24 Desy Setyaningrum, Maria Theresia Sri Budiastuti, Bambang Pujiasmanto, Djoko Purnomo, Supriyono Supriyono. "Morphological and Physiological Responses of L. to Light Intensity ", E3S Web of Conferences, 2021 $<1\%$

Publication

25 Iqbal Effendy, Novianto Novianto, Dia Utami. "PERTUMBUHAN DAN HASIL TIGA VARIETAS KEDELAI DI GAWANGAN DENGAN PEMOTONGAN UJUNG PELEPAH KELAPA SAWIT", Jurnal Agrotek Tropika, 2020 $<1\%$

Publication

26 Welson M. Wangke, Benu Olfie, L. Suzana. "ADOPSI PETANI TERHADAP INOVASI $<1\%$

TANAMAN PADI SAWAH ORGANIK DI DESA
MOLOMPAR KECAMATAN TOMBATU TIMUR,
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA", AGRI-
SOSIOEKONOMI, 2016

Publication

27

Jumiyatun Jumiyatun, Ardi Amir, Rachmiati Ndobe, Supriyadi Supriyadi. "RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI PENANAMAN TUMBUHAN HORTIKULTURA DI DALAM RUANGAN TERTUTUP", Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 2019

Publication

28

Eva Herlinawati, Kuswanhadi Kuswanhadi. "PENGARUH STIMULAN ETEFON TERHADAP PRODUKSI DAN FISILOGI LATEKS BERBAGAI KLON IRR", Jurnal Penelitian Karet, 2018

Publication

29

Rani Wijayanti, Lestari Wibowo, Solikhin Solikhin. "PENGARUH VARIETAS PADI (*Oryza sativa* L.) DAN JENIS KELAMIN KEONG EMAS (*Pomacea* sp.) TERHADAP DAYA RUSAK KEONG EMAS PADA TANAMAN PADI", Jurnal Agrotek Tropika, 2016

Publication

30

Rossy Dwindi, Puji Harsono, Enggar Apriyanto. "Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tiga Varietas Sorgum Terhadap Pemberian

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Pupuk Kandang Dan Mikoriza", Naturalis:
Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan, 2019

Publication

31

Arisandi Arisandi. "INKONSISTENSI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN JARING TRAWL
(Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh
Nelayan Wilayah Perairan Gresik)", JKMP
(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),
2016

Publication

<1 %

32

Dela Heraini, Yeti Rohayeti, Duta Setiawan,
Siti Patmawati. "PERTUMBUHAN DAN
PRODUKTIVITAS RUMPUT GAJAH ODOT
(Pennisetum purpureum Cv. Mott) YANG
DIBERI PUPUK KOTORAN PUYUH", Agrinimal
Jurnal Ilmu Ternak dan Tanaman, 2022

Publication

<1 %

33

M T S Budiastuti, D Purnomo, Supriyono, B
Pujiasmanto, D Setyaningrum. "Effect of light
intensity on growth, yield and indigo content
of Indigofera tinctoria L.", IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

<1 %

34

Nadhea O. Rahmawati, Agus Hartoko, Nurul
Latifah. "Analisis Kelimpahan Fitoplankton di
Perairan Alang-Alang Taman Nasional
Karimunjawa", Jurnal Kelautan Nasional, 2021

Publication

<1 %

-
- 35 Olivia P. G. Lawendatu, Julius Pontoh, Vanda Kamu. "ANALISIS KANDUNGAN KLOROFIL PADA BERBAGAI POSISI DAUN DAN ANAK DAUN AREN (*Arrenga pinnata*)", CHEMISTRY PROGRESS, 2020
Publication
-
- 36 Rizki Amelia, Saiful Hikam, Paul Benyamin Timotiwu. "EVALUASI SEGREGASI FENOTIPE QUANTITATIVE TRAIT LOCI (QTL) PADA TANAMAN PADI VARIETAS LOKAL DAN NASIONAL DI LINGKUNGAN SAWAH BARU", Jurnal Agrotek Tropika, 2014
Publication
-
- 37 Syamsul Bahri, Teuku Hasan Basri, Rahmatsyah Rahmatsyah, Teuku Muhammad Faisal. Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021
Publication
-
- 38 Yugi R Ahadiyat, T Harjoso, Ismangil Ismangil. "Pengaruh Sistem Intercrop Padi Gogo - Rumput Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Padi Gogo", Agrologia, 2018
Publication
-
- 39 Sumardi Sumardi, M. Chozin, Hermansyah Hermansyah. "PERTUMBUHAN DAN HASIL GALUR-GALUR F4 PADI RAWA PADA RAWA LEBAK", Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia, 2019

Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		